

Ποια είναι η συμβολή των σύγχρονων θεραπευτικών σχημάτων στην αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου;

Αριστοτέλης Μπάμιας

Η θέση της χημειοθεραπείας-χημειοακτινοθεραπείας στον καρκίνο στομάχου

- Μετεγχειρητική
- Προεγχειρητική
- Προχωρημένη νόσος

Μετεγχειρητική χημειοθεραπεία στον καρκίνο στομάχου

Η μετεγχειρητική χημειοθεραπεία δεν συνιστάται σαν θεραπεία ρουτίνας στον πλήρως εξαιρεθέντα καρκίνο στομάχου εκτός εάν ο άρρωστος εντάσσεται σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη.

Μετεγχειρητική χημειοακτινοθεραπεία

Μελέτη MacDonald

	Επιβίωση		Ελεύθερη-νόσου επιβίωση	
	3-ετής	Μείωση πιθανότητας θανάτου	3-ετής	Μείωση πιθανότητας υποτροπής
Εγχείρηση	41%		31%	
Εγχείρηση+ χημειοακτινοθεραπεία	50%	35% P=0.005	48%	52% P<0.001

Συμπεράσματα από τη μελέτη του MacDonald

- Παρά το γεγονός ότι το χημειοθεραπευτικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται ανεπαρκές, διαπιστώθηκε όφελος στο σκέλος της ΧΜΘ+ΑΚΘ και η θεραπεία αυτή χορηγείται εκτός μελετών στην πλειοψηφία των ασθενών στις ΗΠΑ.
- Παραμένει το ερώτημα εάν ωφελούνται άρρωστοι που υποβάλλονται σε πληρέστερη επέμβαση από αυτές που υπεβλήθησαν οι ασθενείς στη συγκεκριμένη μελέτη και ιδιαίτερα σε επέμβαση τύπου D2.

Προεγχειρητική χημειοθεραπεία ή χημειοακτινοθεραπεία

Σκοπός: Η αύξηση του ποσοστού των χειρουργικών εξαιρέσεων τύπου R0.

MAGIC TRIAL

Η μελέτη έδειξε αύξηση της επιβίωσης με προεγχειρητική χημειοθεραπεία με 3 κύκλους ECF.

	5-y OS	Median OS
Chemotherapy	36%	24
Surgery	23%	20

Προχωρημένη νόσος

Χημειοθεραπεία - Κλασικοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες και σχήματα

- Φθοριουρακίλη
- Σισπλατίνη
- Αδριαμυκίνη
- Μιτομυκίνη


- Μεθοτρεξάτη
- FAM
- EAP
- FAMTX
- ECF


Epirubicin, cisplatin, infused 5-FU (ECF)

Μέχρι πρόσφατα το παραπάνω σχήμα αποτελούσε τη θεραπεία εκλογής. Οι νεώτερες μελέτες έχουν στόχο:

1. Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας με την αντικατάσταση της επιρουμπικίνης με δοσιταξέλη.
2. Τη μείωση της τοξικότητας με την αντικατάσταση της σισπλατίνης με οξαλιπλατίνη.
3. Τη μεγαλύτερη ευελιξία με την αντικατάσταση της έγχυσης φθοριοουρακίλης με φθοριοπυριμιδίνες από του στόματος.

Οι παρακάτω μελέτες συνοψίζουν τη σημερινή κατάσταση της χημειοθεραπείας στον προχωρημένο καρκίνο στομάχου.





Η θεραπεία με φθοριοπυριμιδίνες από του στόματος είναι εξίσου αποτελεσματική με τη συνεχή έγχυση. Επίσης η οξαλιπλατίνη φαίνεται πιο αποτελεσματική από τη σισπλατίνη.

Τέλος οι βιολογικοί παράγοντες μπορεί να έχουν θέση σε επιλεγμένους ασθενείς, όπως δείχνει η παρακάτω μελέτη, η οποία βρίσκεται υπό εξέλιξη.

